

	休業終了日	
	Day1	Day21
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間5分</p> <p>① DEHPフリー、インラインフィルター付き輸液セット使用</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL キイトルーダ … 200mg/body 所要時間:0時間30分</p> <p>②</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」 … 1袋 デキサト注射液6.6mg 2mL … 3mL 所要時間:1時間0分</p> <p>③</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 末梢側管 ファモチン静注20mg「日新」20mL … 1A ④開始30分前までに</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL ハクシキセル … 175mg/m² 所要時間:2時間0分</p> <p>④</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3A輸液 500mL … 1袋 塩酸マクロプラド注射液10mg「タカ」2mL … 1A 所要時間:1時間0分</p> <p>⑤</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL カルボプラチン … AUC 4,5,6 所要時間:2時間0分</p> <p>⑥</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL アパステン … 15mg/kg ⑦ 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分</p> <p>⑧</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタスコワ錠 10mg … 5錠 分1 医師の指示どおり 点滴開始前に服用</p> <p>アプレビタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 1日1回朝食後 初日はキイトルーダ開始前に服用</p> <p>デカトロン錠 0.5mg … 8錠 分2 朝食後 治療翌日より2日間</p>	